


Newton'sche Sätze (Originalformulierung)

1. Jeder Körper verharrt in seinem Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung, wenn er nicht durch einwirkende Kräfte dazu gezwungen wird, seinen Bewegungszustand zu ändern.
2. Die Änderung der Bewegung ist der Einwirkung der bewegenden Kraft proportional und geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach welcher jene Kraft wirkt.
3. Die Wirkung ist stets der Gegenwirkung gleich; oder: die Wirkungen zweier Körper aufeinander sind stets gleich und von entgegengesetzter Richtung.

Begriffsbildung:

Massenpunkt, Bahnkurve, Masse, Kraft, Beschleunigung, Drehimpuls, Energie, Erhaltungssätze ...

1. Bahnkurve



$$\vec{r}(t) = x(t) \hat{e}_x + y(t) \hat{e}_y + z(t) \hat{e}_z$$

$$:= \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

Geschwindigkeit:

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t) \hat{e}_x + \dot{y}(t) \hat{e}_y + \dot{z}(t) \hat{e}_z$$

Beschleunigung:

$$\vec{a}(t) = \ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t) \hat{e}_x + \ddot{y}(t) \hat{e}_y + \ddot{z}(t) \hat{e}_z$$

2. Newton's Axiome

NM2

1. Axiom (N1):
(Definition von
Inertialsystem)

Es gibt Bezugssysteme (BS), in denen kräftefreie Bewegung
durch beschrieben wird.

Diese BS heißen Inertialsysteme (IS).

N1 gilt nicht in jedem BS (z.B. nicht auf Karusell)

In IS sind physikalischen Gesetze besonders einfach

N1 ist nicht Spezialfall von N2 mit Kraft = 0, sondern
Definition von IS.

2. Axiom (N2):
(beschreibt Dynamik)

In einem IS folgt die Bewegung unter Einfluß einer
Kraft folgendem Gesetz:

NM3

Kraft

Impuls

Masse Geschw.

Einheit =

N2 beinhaltet

- (i) Definition der Masse (vergleiche Beschl. für gleiche Kraft),
- (ii) Definition der Kraft (als Beschleunigung mal Masse),
- (iii) Aussage über Bahnbewegung


N2 gilt nur für "nicht-relativistische" Geschwindigkeiten:

NM4

3. Axiom (N3):
(Actio = Reactio)

1.ter Zusatz:

Kraft entlang Verbindungslinie



2.ter Zusatz:
(Superpositions-
Prinzip)

Gesamtkraft

Summe der Einzelkräfte



Gültigkeit von N3 ist eingeschränkt, denn N3 impliziert "instantane" Reaktion, im Widerspruch zur speziellen Relativitätstheorie (nichts propagiert schneller als Licht)

Ausweg: Quantenfeldtheorie: Kraft via Austausch von Photonen f. EM-WW, Gluonen f. starke WW, Gravitonen für Gravitation

Beispiel: Lösung von N2 für 1-dimensionales Problem

NM5

Betrachte:

$$m \ddot{x} = K(x(t)) \quad (5.1)$$

↖ ortsabhängige Kraft

Wobei

$$K(x) = - \partial_x U(x) \quad \partial_x \equiv \frac{\partial}{\partial x} \quad (5.2)$$

\dot{x} x (5.1):

(5.3)

(5.4)

Integrieren:

$\int dt$

Integrationskonstante
(zeitunabhängig) (5.5)

Gesamtenergie:
(erhaltene Größe,
weil zeitunabhängig)



(5.6)

Kinetische, Potentielle Energie

(5.5) nach \dot{x} gelöst:

NM 6

(6.1)

(6.2)

(6.3)

Anfangsbedingungen:


$$x(t_0) = \quad , \quad \dot{x}(t_0) = \quad ,$$

(6.4)

legen Integrationskonst. fest:

Graphische Analyse:

NM 7



Umkehrpunkte:

Bei $\dot{x} = 0$, also bei

Zwischen Umkehrpunkten ist Bewegung periodisch:

Periode:

(7.1)

3. Erhaltungssätze

NM8

Zunächst mittels N2 hergeleitet, später (eleganter) mittels Lagrange-Formalismus
 "zu Fuß" "tieferer Grund":

Symmetrien!

NZ:

$$\frac{d}{dt} \vec{p} = \vec{K} \quad (8.1)$$

(8.1)

Impulserhaltung:

$$\vec{K} = 0 \Rightarrow \vec{p} = \text{const.} \quad (8.2)$$

(8.2)

Definition Drehimpuls:


$$\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p} \quad (8.3)$$

(8.3)

Definition Drehmoment:
 (beide abhängig von

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{K} \quad (8.4)$$

(8.4)



(9.1) NM9

$$\dot{\vec{l}} = \vec{M} \quad (9.2)$$

("NZ für Rotationen") (9.2)

Drehimpulserhaltung:

$$\vec{M} = 0 \Rightarrow \vec{l} = \text{const.} \quad (9.3)$$

(9.3)


Definition v. Arbeit:

Teilchen (Masse m) bewege sich unter Einfluss einer äusseren Kraft von 1 nach 2 entlang Weg C. Die von der Kraft auf m geleistete Arbeit ist:

Vorzeichen? Denke an Schwerkraft:
 oben
 $\vec{F}_g \downarrow$
 unten
 $\int_{\text{oben}}^{\text{unten}} d\vec{r} \cdot \vec{F}_g =$

$$W = \int_C \vec{K} \cdot d\vec{r} \quad (9.4)$$

(9.4)



= vom Kraftfeld auf m übertragene Energie

$$(9.4) \\ A_{1 \rightarrow 2} =$$

$$(10.1) \quad \underline{[NM/10]}$$

$$=$$

$$(10.2)$$

$$=$$

$$(10.3)$$

= Energieänderung auf Grund der Geschwindigkeitsänderung

$$(10.4)$$

Definition:
Kinetische Energie

$$E_K = T =$$

Einheiten:

$$\text{Joule [J]} =$$


$$=$$

Def: Konservatives Kraftfeld


Falls Arbeit zwischen 1 und 2 unabhängig vom Weg ist, wird Kraftfeld konservativ genannt

$$\underline{[NM/11]}$$

$$(9.4) \\ A_{12} = \int d\vec{r} \cdot \vec{K}_{\text{kons}} = \int d\vec{r} \cdot \vec{K}_{\text{kons}} \quad (11.1)$$



$$0 = \int d\vec{r} \cdot \vec{K}_{\text{kons}} \quad (\text{Stokes})$$



(11.3) gilt für beliebige Fläche,

also kann \vec{K}_{kons} wie folgt geschrieben werden:

$$\Rightarrow$$

$$(11.4)$$

$$(11.3)$$

skalares Feld, heißt "Potential", oder "potenzielle Energie"


Nullpunkt beliebig

denn:

$$(11.5)$$

$$(\sum_{ijk} \partial_j \partial_k u = 0)$$

Energieerhaltungssatz:
Integriere (11.4)



{ - Änderung v.
U in Richtung
v. d \vec{r}
" "
(+ Änderung v. T)

$$U(r_1) - U(r_2) = \int_1^2 d\vec{r} \cdot [-\vec{\nabla} U(\vec{r})] \quad (12.1)$$

$$\stackrel{(11.4)}{=} \quad (12.2)$$

$$\stackrel{(9.4)}{=} \quad (12.3)$$

$$\quad (12.4)$$

Entlang einer Trajektorie (Bahn) in einem konservativem Kraftfeld bleibt die Gesamtenergie $E=T+U$ eines Teilchens erhalten.

Alternative Herleitung:

$$T_2 - T_1 = A_{1 \rightarrow 2} \stackrel{(12.3, 1)}{=} \int_1^2 d\vec{r} \cdot (-\vec{\nabla} U(\vec{r}(t))) \quad (13.1)$$

$$= - \int_1^2 dt \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right) \frac{dU(\vec{r}(t))}{d\vec{r}} \quad (13.2)$$

$$= - \int_1^2 dt \frac{d}{dt} U(\vec{r}(t)) \quad (13.3)$$

$$= - [U(\vec{r}(t_2)) - U(\vec{r}(t_1))] = U_1 - U_2 \quad (13.4)$$

Energieerhaltung gilt nicht für zeitabhängige Potentiale:

Falls $U = U(\vec{r}(t), t)$, gilt (13.2) \rightarrow (13.3) nicht:
 \uparrow explizite Zeitabhängigkeit,

denn dann :
$$\frac{d}{dt} U(\vec{r}(t), t) = \vec{\nabla} U \cdot \dot{\vec{r}} + \frac{\partial U}{\partial t}$$

Grund: externes System ist für zeitänderung des Potentials verantwortlich, und kann Energie zuführen oder abziehen.

Bewegungsgl. $m\ddot{\vec{r}} = \vec{K}$ ist Diff. Gl. 2.

Erhaltungssätze
heissen "Integrale der
Bewegung", weil
sie Diff.-Gl. 1. Ordnung sind

Erhaltungssätze:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 + U = E = \text{const} & \text{" 1. Ord} \\ m \dot{\vec{r}} = \vec{p} = \text{const} & \text{" 1. Ord} \\ \vec{r} \times (m \dot{\vec{r}}) = \vec{L} = \text{const} & \text{" 1. Ord} \end{cases}$$

Beispiel einer kons.
Kraft: Lorentzkraft

Kraft auf geladenes Teilchen im Magnetfeld:

$$\begin{aligned} & \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) \\ &= \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) \\ &= \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \end{aligned}$$

Energie ist
erhalten, also ist
Kraft konservativ.

$$d\vec{r} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right) dt$$

$$\vec{K}_{\text{Lorentz}} =$$

(14.1)

$$T_2 - T_1 = A_{12} = \int_1^2 d\vec{r} \cdot \vec{K}$$

