

# VARIATIONS PRINZIPIEN

15 - 06.06.07

L55

Ziel:

Herleitung v. (L2) aus einem Variationsprinzip (VP),  
das sog. "Hamiltonsche VP". (siehe S. 67)

Mathematisches Rüstzeug: "Variationsrechnung"

Variation ohne Nebenbedingungen (Fließbach, Kap. 12)

Allgemeine  
Problemstellung

$F(y, y', x)$  sei eine gegebene Funktion v.  $y, y', x$

$y =$  sei eine Funktion v.  $x$ , mit

$y' =$

Ein "Funktional"  $J[y]$   
[angedeutet durch  
eckige Klammern]  
bildet Funktion  $y(x)$   
auf Zahl ab.

Welche Funktion  $y(x)$  macht das Funktional

$$J = J[y] = \quad (1)$$


extremal, unter Randbedingungen

? (2)

Konkretes Beispiel (Teil 1):

$P_2$   
 $(x_2, y_2)$

L56



(1)

Frage:

Welche Funktion  $y(x)$  minimiert die Bogenlänge zwischen  $P_1$  und  $P_2$ ?

"Geratene" Antwort:

Variationsrechnung ist ein systematisches Verfahren, solche Fragen zu beantworten!

Bestimmung des

"Abstands-  
Funktionals":

$$J = J[y] =$$

(2)

=

(3)

Ende v. Beispiel (Teil 1)

# Strategie zur Findung der Extremalfunkt: "Variationsprinzip"

L57

Gesuchte Fkt. sei

Vergleichsfkt. sei

infinitesimal

beliebig

(1)

mit Randbedingung:


(2)

Extremalbedingung:

$J[y + \varepsilon \eta]$  sei extremal bei  $\varepsilon = 0$

(3)

Mathematisch  
formalisiert:



(4)

$$J(\varepsilon) = J[y + \varepsilon \eta]$$



Konsequenzen v. (57.4)

$$J[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(y, y', x) dx$$

L58

(1)

Taylor-Entwicklung  
in  $\varepsilon$  um  $\varepsilon = 0$ :

$$= \int_{x_1}^{x_2} \left\{ F(y, y', x) + \varepsilon \left( F_y \eta + F_{y'} \eta' \right) + \frac{\varepsilon^2}{2} \left( F_{yy} \eta^2 + 2 F_{yy'} \eta \eta' + F_{y'y'} \eta'^2 \right) + \dots \right\} dx$$

(2)

(57.4)  $\Rightarrow$

$$0 = \frac{dJ[y + \varepsilon \eta]}{d\varepsilon} =$$

(3)

Partielle Integration  
von  $F_{y'} \eta'$ -Term:

$$\int_1^2 f g' = [f g]_1^2 - \int_1^2 f' g$$

$$0 = \int_{x_1}^{x_2} \left\{ F_y \eta + F_{y'} \eta' \right\} dx$$

(4)

(4) muss für beliebige  
 $\eta(x)$  gelten:  $\Rightarrow$



(5)

Betrachte:

$$I = \int_{x_1}^{x_2} f(x) g'(x)$$

kann wie folgt  
umgeformt werden

$$= \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \right.$$

=

Dies ist nützlich, falls  $f'(x) g(x)$  leichter zu integrieren ist als  $f(x) g'(x)$ .

Beispiel:

$$f(x) =$$

$$g'(x) =$$

$$g(x) =$$

$$f'(x) =$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\infty} \underbrace{x}_{f(x)} \underbrace{e^{-x}}_{g'(x)} = \int_0^{\infty} \left\{ \underbrace{\frac{d}{dx}}_{f'(x)} \left[ \underbrace{x}_{f(x)} \underbrace{(-e^{-x})}_{g(x)} \right] - \underbrace{1}_{f'(x)} \cdot \underbrace{(-e^{-x})}_{g(x)} \right\} \\ &= \left[ \cancel{x (-e^{-x})} \right]_0^{\infty} \overset{=0}{=} + \int_0^{\infty} (+e^{-x}) = [-e^{-x}]_0^{\infty} = 1 \end{aligned}$$

(58.5) explizit:

"Euler-Lagrange - Gl. (ELG)  
der Variationsrechnung":

[Gl. für die gesuchte  
Funktion  $y(x)$ ]

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0$$

L59



(1)

Testbeispiel:

minimale Bogenlänge?

$$F(y, y', x) \stackrel{(56.3)}{=}$$

(2)

ELG: (1):

(3)

"Integration":

(4)

## Zusammenfassung der Herleitung in Kurznotation:

L60

$$\delta J = \quad (1)$$

$$= \quad (2)$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} dx \left( F_y \right) \delta y \quad (3)$$

$$\delta J = 0 \Leftrightarrow \quad (4)$$

Beispiel: Schnellster Fallweg?  
"Problem der Brachistochrone", (Bernoulli)

["brachistos" = kürzeste, "chronos" = Zeit]



L61

Für welche Form der "Rutschbahn"  $y(x)$  ist Rutschzeit minimal?

Für Animation des rollenden Teilchens, siehe: <http://home.ural.ru/~iagsoft/BrachJ2.html>

Historie: <http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Brachistochrone.html>

Excerpt from an article by: J J O'Connor and E F Robertson

The brachistochrone problem was posed by Johann Bernoulli in Acta Eruditorum in June 1696:

"I, Johann Bernoulli, address the most brilliant mathematicians in the world. Nothing is more attractive to intelligent people than an honest, challenging problem, whose possible solution will bestow fame and remain as a lasting monument. Following the example set by Pascal, Fermat, etc., I hope to gain the gratitude of the whole scientific community by placing before the finest mathematicians of our time a problem which will test their methods and the strength of their intellect. If someone communicates to me the solution of the proposed problem, I shall publicly declare him worthy of praise."

The problem he posed was the following:-

"Given two points A and B in a vertical plane, what is the curve traced out by a point acted on only by gravity, which starts at A and reaches B in the shortest time."


Now Johann Bernoulli and Leibniz deliberately tempted Newton with this problem. It is not surprising, given the dispute over the calculus, that Johann Bernoulli had included these words in his challenge:-

"...there are fewer who are likely to solve our excellent problems, aye, fewer even among the very mathematicians who boast that [they]... have wonderfully extended its bounds by means of the golden theorems which (they thought) were known to no one, but which in fact had long previously been published by others."

According to Newton's biographer Conduitt, he solved the problem in an evening after returning home from the Royal Mint. Newton:-

"... in the midst of the hurry of the great recoinage, did not come home till four (in the afternoon) from the Tower very much tired, but did not sleep till he had solved it, which was by four in the morning."

Für welche Form der "Rutschbahn"  $y(x)$   
ist Rutschzeit minimal?



L 62

Bestimmung des "Rutschdauer-" Funktionals:

$$t_{21} = \int_2^1 dt =$$

Bogenlänge

momentane Geschw.

(1)

wobei:  $ds =$

(2)

Energie-Erhaltung:

(3)

(3), (2) in (1):

$$t_{21} = J[y] =$$

(4)

ELG:

konkret für (62.4),

$$F(y, y', x) = \frac{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}{\sqrt{2g(y_1 - y(x))}}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{\partial F}{\partial y}$$

(1) L 63

(2)

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{1}{[2g(y_1 - y)]^{1/2}} \cdot \frac{+1/2 \cdot 2y'}{[1 + y'^2]^{1/2}} \right] = [1 + y'^2]^{1/2} \frac{(-1/2)(-2g)}{[2g(y_1 - y)]^{3/2}}$$

Diese Differentialgleichung bestimmt die Form der gesuchten Kurve  $y(x)$ .


Ihre Lösung sei vollständigshalber (ohne Herleitung) erwähnt:

Integration liefert:

$$\left[ 1 + \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 \right] y = k^2$$

Parametrische Lösung:  
(= Cycloid)

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2} k^2 (\theta - \sin \theta) \\ y &= -\frac{1}{2} k^2 (1 - \cos \theta) \end{aligned}$$



Für eine Herleitung, siehe:

<http://mathworld.wolfram.com/BrachistochroneProblem.html>

Für Animation einer Zykloide, siehe:

<http://www.ies.co.jp/math/java/calc/cycloid/cycloid.html>

### Verallgemeinerung:

Funktional v.  
mehreren Fkt.  
 $y_1(x), \dots, y_N(x)$

Gesucht:

Vergleichsfkt.:

Extremalbedingung:

$$J = J[y_1, \dots, y_N]$$

$$\text{Randbedingung: } y_i(x_1) = \dots, y_i(x_2) = \dots$$

$$y_i(x), \text{ für die } J[y_1, \dots, y_N] \text{ extremal ist.}$$

(unabhängige Variationsparameter)

$$J[y + \varepsilon \eta] \text{ sei minimal bei } \varepsilon = 0$$

$$\left. \frac{dJ[y + \varepsilon \eta]}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = 0 \quad (\text{denn } \varepsilon_i \text{ sind unabhängig})$$

N mal dasselbe wie  
vorhin:

$\Rightarrow$



### Weitere Verallgemeinerung: (zur Kenntnisnahme)

Funktional:

Randbedingungen:

Gesucht:

Vergleichsfunktion:

mit Ableitungen:

$$N \text{ Fkt. } y_i(x_\nu) :=$$

jeweils als Fkt. v.  $R$  Variablen,

$$J[y_i] := J[y_1, \dots, y_N] =$$

Alle  $y_i(x_\nu)$  seien auf Rand  $B$  fest vorgegeben

Funktionen  $y_i(x_\nu)$ , für die  $J[y_i]$  extremal ist

$$y_i(x_1, \dots, x_R) + \varepsilon_i \eta_i(x_1, \dots, x_R)$$

(unabhängige Variationsfunktionen, jeweils abhängig v.  $R$  Parametern  $x_\nu$ )

Extremalbedingungen  
[wie (6.4)]

$$0 = \left. \frac{dJ[y_i + \varepsilon_i \eta_i]}{d\varepsilon_i} \right|_{\varepsilon_i=0}$$

L66

$\varepsilon_i$  sind alle  
unabhängig:

$\eta_i$  beliebig:  $\Rightarrow$

$$0 = \int_B dx_1 \dots dx_N \left\{ \frac{\partial F}{\partial y_i} \eta_i + \sum_{\nu=1}^R \frac{\partial F}{\partial (\partial_\nu y_i)} \partial_\nu \eta_i \right\}$$

partielle Integration  $\rightarrow$   $\left\{ - \sum_{\nu=1}^R \left( \frac{d}{dx_\nu} \frac{\partial F}{\partial (\partial_\nu y_i)} \right) \eta_i + \text{Randterme} \right\}$   $\forall i=1, \dots, N$

N - EL-Gleichungen:

$$\sum_{\nu=1}^R \frac{d}{dx_\nu} \frac{\partial F}{\partial (\partial_\nu y_i)} = \frac{\partial F}{\partial y_i}, \quad \forall i=1, \dots, N \quad (6.3.2)$$

Weitere mögliche  
Verallg.:

- (i) Höhere Ableitungen, z.B.  $F(y, y', y'', y''')$  ..
- (ii) keine Randbedingungen vorgeben ...
- (iii) Variation mit Nebenbedingungen ...

Hamiltonsches Prinzip der kleinsten (extremalen) Wirkung

L67

Def: "Wirkung"

$$S = S[q] =$$

(Fließbach, 14)

(1)

Das Funktional  $S[q]$  wird die  
der Bahnkurve  $q(t)$  genannt.

$(\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_f)$  geschw.  
 $(q_1, \dots, q_f)$  Koordinaten

Hamiltonsche Prinzip (HP):

Dynamische Evolution  $q(t)$  des Systems zwischen  
 $q(t_1) = q_1$  und  $q(t_2) = q_2$  erfolgt so, dass die  
Wirkung extremal wird,  
unter Variation der Bahnkurve  $q(t)$ ,  
mit Randbedingung

(2)

(2)

Beweis:

L68

Identifiziere:  $F \leftrightarrow$  ,  $y_i \leftrightarrow$  ,  $x \leftrightarrow$  (1)  
 $y'_i \leftrightarrow$

ELG (6.4)

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'_i} = \frac{\partial F}{\partial y_i} ;$$

$$\delta S[q] = 0 \Leftrightarrow$$

(2)

ELG für Hamiltonsches Prinzip liefern Lg2 !!

f Diff-gl. 2. Ordnung  $\Rightarrow$  2f Integrationskonst.

entweder:  $q_1, \dots, q_f$  und  $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_f$  , bei  $t = t_1$

oder :  $q_1, \dots, q_f$  bei  $t = t_1$  und  $t = t_2$

Quantenmechanik à la Feynman

L69

•  
2

•  
1

Wahrscheinlichkeit, von  $P_1$  nach  $P_2$  in Zeit  $t = t_2 - t_1$  zugegangen, ist:

$W_{1 \rightarrow 2}$

$$\left| \sum_{\text{alle Wege zwischen } 1 \rightarrow 2} e^{i S[q]/\hbar} \right|^2 \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Für die meisten Wege mitteln sich die Phasen weg.

Ausser für die Wege für die  $\delta S = 0$ .

Bündel um den klassischen Weg

$\Rightarrow$  Hamiltonsches Prinzip !!

